

l'exemplaire cité plus haut de St-André-les-Alpes, et j'ajoute que trois autres exemplaires de cette même localité forment encore ici, d'une façon très remarquable, le passage de cette forme, à lignes fines et distinctes, à la forme typique. C'est à ce caractère certainement qu'est dû l'aspect *foncé* de *prohaskaella*, la région brune costale portant des parties blanchâtres beaucoup plus réduites que chez *subericinella* vrai.

Je serais donc porté à considérer *prohaskaella* comme une forme foncée de *subericinella*; ce serait la variation extrême en sens opposé de celle du bord de l'Atlantique.

Une décision catégorique pourrait être fournie par les chenilles; malheureusement, en ce qui regarde *prohaskaella*, le Dr REBEL ne donne qu'un renseignement négatif: aucune bruyère, dit-il, n'existait loin autour du lieu de capture. Il était préoccupé, en disant cela, de la séparer davantage d'*ericinella*. c'était assez superflu. Quant à *subericinella*, le Catalogue Staudinger de RAGONOT porte manuscrite la mention suivante: *Geuista germanica*. Je n'ai pu savoir d'où RAGONOT avait eu ce renseignement et n'en ai pas d'autre sur ce point.

Nouveaux Cérambycides [COL.] de la Chine méridionale. I (1)

par Maurice PIC.

Strangalia (Parastrangalia) apicicornis, n. sp. — *Nilida*, *elytris sparse pubescentibus, rufo-testacea, antennis medio et apice nigris, elytrorum lateribus medio nigro maculatis*.

Brillant, élytres éparsément pubescents, d'un roux testacé, avec le prothorax étroitement bordé de noir, les élytres maculés de noir sur leur milieu, la macule thoracique n'atteignant pas la suture et bordée d'une nuance plus claire que la couleur foncière. Antennes un peu plus longues que le corps, à articles 1 à 5 roussâtres, sommet du 5^e, 6^e, 8^e et 11^e noirs, 9^e et 10^e blanchâtres. Tête large et pas très longue; yeux gros. Prothorax plus long que large, rétréci et étranglé en avant, à ponctuation médiocre, serrée. Élytres assez larges aux épaules, progressivement rétrécis en arrière, échancrés au sommet, un peu creusés longitudinalement sur leur milieu, d'un testacé roussâtre plus clair par places, avec une macule noire au milieu des côtés. Pattes pas très longues. — Long. 12 mm.

(1) Ces espèces, qui sont originaires du Yunnan, m'ont été communiquées par notre collègue P. GUERRV; les *types* uniques font partie de sa collection.

Cette espèce ressemble à *S. Argodi* Théry, mais les antennes sont moins foncées à la base, la coloration de l'avant-corps est roussâtre et les dessins foncés des élytres sont réduits.

Xylotrachus multisignatus, n. sp. — *Opacus, niger, dense luteo pubescens et nigro multimaculatus, antennis pedibusque testaceis.*

Mat, noir, densément revêtu de pubescence jaune; élytres à transparence fauve par places; orné de nombreuses macules noires; antennes et pattes testacées. Tête assez étroite, munie sur le vertex de 4 petites carènes, les médianes jointes en avant: antennes courtes et grêles. Prothorax subglobuleux, un peu rétréci aux extrémités, orné d'une ligne médiane noire amincie en avant et élargie en arrière et, de chaque côté de celle-ci, sur le milieu, d'une macule noire. Élytres peu plus larges que le prothorax, courts, un peu atténués postérieurement, subarqués au sommet, ornés chacun des dessins noirs suivants: quatre macules antérieures disposées sur deux rangées, celles-ci en partie jointes, une macule postscutellaire commune, deux macules allongées, placées près du milieu, l'externe étant plus longue, un trait latéral antécapical, flanqué d'une petite macule interne. Pattes courtes. — Long. 15 mm.

Cette jolie espèce, très distincte par son système de coloration, peut se placer près de *X. diversesignatus* Pic.

Hesperophanes Guerryi, n. sp. — *Elongatus, subparallelus, nitidus, nigro-piceus, griseo-argenteo fasciculatus, antennis pedibusque rufescentibus.*

Allongé, subparallèle, brillant, noir de poix, avec les membres roussâtres, orné d'une pubescence grise à reflets argentés, celle-ci disposée en mouchetures sur les élytres. Tête plus étroite que le prothorax, à ponctuation plus ou moins large et serrée, sillonnée entre les yeux; antennes dépassant les élytres d'un article, longuement et éparquement pubescentes. Prothorax court, sinué et faiblement tuberculé sur les côtés, inégal en dessus sur le disque, à ponctuation semblable à celle de la tête. Élytres plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, subarrondis au sommet, peu fortement et éparquement ponctués, la ponctuation s'effaçant vers l'extrémité, faiblement impressionnés à la base en dedans des épaules. Pattes moyennes, pubescentes et ornées de longs poils clairs. — Long. 25 mm.

Cette grande espèce peut se placer près de *H. cribricollis* Bates, qui ne m'est connu que par la description; la forme des élytres semble plus parallèle et le revêtement est différent.